

大腸がん

化学療法レジメン集



国家公務員共済組合連合会　立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
大腸がん	AFL＋FOLFIRI 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アフリベルセプト	4mg/kg		DIV	60 分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡	180mg/㎡	DIV	90～120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46 時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Bev＋ FOLFIRI 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	5mg/kg		DIV	90分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡	180mg/㎡	DIV	90～120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1～d3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Bev＋ mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	5mg/kg		DIV	90分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1～d3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Bev＋ SOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	7.5mg/kg		DIV	90分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
S－1	80mg/㎡ <1.25 ㎡ :80mg <1.25～1.5 ㎡ :100mg >1.5 ㎡ :120mg		PO	1 日2回 朝夕食後	d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Bev＋IRIS療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	5mg/kg		DIV	90 分	d1、15
イリノテカン	125mg/㎡		DIV	90 分	d1、15
S－1	<1.25 ㎡ :80mg <1.25～1.5 ㎡:100mg >1.5 ㎡ :120mg		PO	1 日 2 回 朝夕食後	d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	mFOLFOXIRI±Bev 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
アバスチン	5mg/kg		DIV	30～90 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡		DIV	60 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
5-FU	2400mg/㎡		DIV	46 時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	bi-weekly Cet＋mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セツキシマブ	500mg/㎡		DIV	120 分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46 時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Cet＋FOLFIRI 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セツキシマブ	初回 :400mg/㎡ 2 回目以降 :250mg/㎡ 又は 500mg/㎡		DIV	120 分(初回) 60 分(2 回目～) 120 分	d1、8:毎週投与 d1:隔週投与
レボホリナート	200mg/㎡	180mg/㎡	DIV	120 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡		DIV	90～120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Cet＋mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セツキシマブ	初回 :400mg/㎡ 2 回目以降 :250mg/㎡ 又は 500mg/㎡		DIV DIV	120 分(初回) 60 分(2 回目～) 120 分	d1、8:毎週投与 d1:隔週投与
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		持続静注	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡			46時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	セツキシマブ ± CPT－11 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【毎週投与法】					
セツキシマブ	初回 :400mg/㎡ 2 回目以降 :250mg/㎡		DIV	120 分(初回) 60 分(2 回目～)	d1、8、15、22、29、36
イリノテカン	100mg/㎡		DIV	90～120 分	d1、8、15、22
【隔週投与法】					
セツキシマブ	初回 :400mg/㎡ 2 回目以降 :250mg/㎡		DIV	120 分(初回) 60 分(2 回目～)	d1、8、15、22、29、36、43
イリノテカン	150mg/㎡		DIV	90～120 分	d1、15、29
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	【毎週投与法】42日 【隔週投与法】49日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Cetuximab+Binimetinib+Encorafenib 併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セツキシマブ	初回 :400mg/㎡ 2 回目以降 :250mg/㎡ 又は 500mg/㎡		DIV DIV DIV	120 分(初回) 60 分(2 回目～) 120 分	d1、(8) (2 回目以降へ) d1、8 d1
エンコラフェニブ	300mg/day		PO	1 日 1 回	d1～14
ビニメチニブ	90mg/day		PO	1 日 2 回	d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	Cetuximab+Encorafenib 併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セツキシマブ	初回 :400mg/㎡ 2 回目以降 :250mg/㎡ 又は 500mg/㎡		DIV	120 分(初回) 60 分(2 回目～) 120 分	d1、(8) (2 回目以降へ) d1、8 d1
エンコラフェニブ	300mg/day		PO	1 日 1 回	d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	FOLFIRI 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡	180mg/㎡	DIV	90～120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	S－1＋CPT-11療法 （IRIS療法）

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
イリノテカン S－1	125mg/㎡ 80mg/㎡ <1.25 ㎡ :80mg <1.25～1.5 ㎡ :100mg >1.5 ㎡ :120mg		DIV PO	90分 1 日2回 朝夕食後	d1、15 d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
大腸がん	mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	パニツムマブ単独 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ	6mg/kg		DIV	60分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	PD または PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
大腸がん	Pan＋CPT－11療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ	6mg/kg		DIV	60 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡		DIV	90 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	FOLFIRI＋パニツムマブ 療法

抗がん剤名	標準投与	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ	6mg/kg		DIV	60分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	90～120 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡	180mg/㎡	DIV	120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	PD または PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
大腸がん	Pan. ＋IRIS療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ	6mg/kg		DIV	60 分	d1、15
イリノテカン	100mg/㎡		DIV	90 分	d1、15
S-1	80mg/㎡ <1.25 ㎡ :80mg <1.25～1.5 ㎡ :100mg >1.5 ㎡ :120mg		PO	1 日 2 回 朝夕食後	d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	mFOLFOX6＋パニツムマブ 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ	6mg/kg		DIV	60分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	PD または PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
大腸がん	SOX＋Pan．療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ	6mg/kg		DIV	60 分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
S－1	80mg/㎡ <1.25 ㎡ :80mg <1.25～1.5 ㎡ :100mg >1.5 ㎡ :120mg		PO	1 日 2 回 朝夕食後	d1 夕～15 朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	RAM＋FOLFIRI 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ラムシルマブ	8mg/kg		DIV	60 分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡	180mg/㎡	DIV	90～120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46 時間	d1～3
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	SIRB療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	7.5mg/kg		DIV	90 分	d1
イリノテカン	150mg/㎡		DIV	90 分	d1
S－1	80mg/㎡ <1.25 ㎡ :80mg <1.25～1.5 ㎡ :100mg >1.5 ㎡ :120mg		PO	1 日 2 回 朝夕食後	d1 夕～15 朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	SOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
オキサリプラチン S－1	130mg/㎡ 80mg/㎡ <1.25 ㎡ :80mg <1.25～1.5 ㎡ :100mg >1.5 ㎡ :120mg		DIV PO	120 分 1 日 2 回 朝夕食後	d1 d1～14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	進行・再発がん:規定なし 術後補助療法:8 コース		

がん種	レジメン名
大腸がん	TAS－102＋Bev 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ・ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩配合剤	5mg/kg 70mg/m^2		DIV PO	30～90 分	d1、15 d1～5、8～12
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	XELIRI ± Bev 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	7.5mg/kg		DIV	30～90 分	d1
イリノテカン	200mg/㎡		DIV	90 分	d1
カペシタビン	1600mg/㎡		PO	1 日 2 回 朝夕食後	d1 夕～15 朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	PD または認容できない有害事象の発現まで		

がん種	レジメン名
大腸がん	XELOX＋Pan 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ	6mg/kg		DIV	60 分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
カペシタビン	2000mg/㎡		PO	1 日 2 回 朝夕食後	d1 夕～15 朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
大腸がん	XELOX ± アバスチン 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	7.5mg/kg		DIV	90分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
カペシタビン	2000mg/㎡		PO	1 日2回 朝夕食後	d1夕～15朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD または認容できない有害事象の発現まで		

がん種	レジメン名
MSI-High 大腸がん	ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
	【1～4 コース】				
ニボルマブ	240mg/body		DIV	30 分	d1
イピリムマブ	1mg/kg		DIV	30 分	d1
	【5 コース目以降】				
ニボルマブ	①240mg/body 又は ②480mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	【1～4 コース】 21 日 【5 コース目以降】 ① 14 日 又は ② 28 日	総コース数		併用 4 コース 5 コース目以降:ニボルマブ単独	

がん種	レジメン名
MSI-High 大腸がん	ニボルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	① 240mg/kg 又は ②480mg/kg		DIV DIV	30 分 30 分	d1 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	① 14 日 又は ② 28 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
大腸がん	パニツムマブ＋ソトラシブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パニツムマブ ソトラシブ	6mg/kg 960mg/日	6mg/kg	DIV PO	60分	d1 連日
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	PD または PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
大腸がん	ペルツズマブ＋トラスツズマブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【点滴静注】					
ペルツズマブ	420mg		DIV	30～60 分	d1
(初回投与時)	840mg		DIV	(60 分)	d1
トラスツズマブ	6mg/kg		DIV	30～90 分	d1
(初回投与時)	8mg/kg		DIV	(90 分)	d1
【皮下注】					
ペルツズマブ	600 ㎎/body		SC	5 分以上	d1
(初回投与時)	1200 ㎎/body			8 分以上	d1
トラスツズマブ	600 ㎎/body		SC	5 分以上	d1
(初回投与時)	600 ㎎/body			8 分以上	d1
ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞｱﾙﾌｧ注	20,000U/body		SC	5 分以上	d1
(初回投与時)	30,000U/body			8 分以上	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
大腸がん	エンコラフェニブ+セツキシマブ+mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セツキシマブ	500mg/㎡		DIV	120 分(初回) 60 分(2 回目～)	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
5－FU	400mg/㎡		DIV	全開	d1
5－FU	2400mg/㎡		持続静注	46 時間	d1～3
エンコラフェニブ	300mg/day		PO	1 日 1 回	連日
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	規定なし		