

胃がん

化学療法レジメン集



国家公務員共済組合連合会 立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
胃がん	HER+mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、8 等)
トラスツズマブ	初回:8mg/kg		CV	90 分	d1,22
	維持:6mg/kg			30～90 分	
レボホリナート	200mg/㎡		CV	120 分	d1,15,29
オキサリプラチン	85mg/㎡		CV	120 分	d1,15,29
フルオロウラシル	400mg/㎡		CV	全開	d1,15,29
フルオロウラシル	2400mg/㎡		CV	46 時間	d1,15,29
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	42 日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	HER+SOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、8 等)
トラスツズマブ	初回:8mg/kg 維持:6mg/kg		DIV	90 分 30～90 分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
S-1	<1.25 ㎡ : 80mg <1.25～1.5 ㎡ : 100mg >1.5 ㎡ : 120mg		PO	1 日 2 回 朝夕	d1 夕～d15 朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	HER+XELOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
トラスツズマブ	初回:8mg/kg 維持:6mg/kg		DIV	90 分 30～90 分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
カペシタビン	2000mg/㎡		PO	朝夕	d1夕～d15朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	KEYNOTE-811 試験

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
トラスツズマブ	初回:8mg/kg		DIV	90 分	d1
	維持:6mg/kg			30～90 分	
【CAPOX 群】					
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
カペシタビン	2000mg/㎡		PO	1 日2回 朝夕	d1夕～d15朝
【SOX 群】					
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
S-1	<1.25 ㎡ : 80mg		PO	1日 2 回 朝夕	d1夕～d15朝
	<1.25～1.5 ㎡ : 100mg				
	>1.5 ㎡ : 120mg				
【FP 群】					
シスプラチン	80mg/㎡		DIV	120 分	d1
フルオロウラシル	800mg/㎡		DIV	24時間	d1～5
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD になるまで 【CAPOX 群、SOX 群】 ： L-OHP6～8 コースまで 【FP 群】 ： CDDP 6 コースまで 【その他】 ： ペムブロリズマブは 35 コースまで、 その他は 35 コース以降追加で最大 1 年間		

がん種	レジメン名
胃がん	mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
フルオロウラシル	400mg/㎡		DIV	全開	d1
フルオロウラシル	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	Pembrolizumab+CAPOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
カペシタビン	2000mg/㎡		PO	1日 2 回 朝夕	d1夕～d15朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD になるまで ※L-OHP6 コースまで、その他は 35 コースまで		

がん種	レジメン名
胃がん	Pembrolizumab＋FP 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【導入療法】					
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
シスプラチン	80mg/m^2		DIV	120 分	d1
フルオロウラシル	800mg/m^2		DIV	24 時間	d1～5
【維持療法】					
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
フルオロウラシル	800mg/m^2		DIV	24 時間	d1～5
1 コースの日数	21 日	総コース数		【維持療法】6 コースまで 【維持療法】35 コースまで	

がん種	レジメン名
胃がん	RAM＋Nab-PTX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/㎡		DIV	60 分	d1、8、15
ラムシルマブ	8mg/kg		DIV	60 分	d1、15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	RAM＋PAC 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	80mg/㎡		DIV	60 分	d1、8、15
ラムシルマブ	8mg/kg		DIV	60 分	d1、15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	RAM 単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ラムシルマブ	8mg/kg		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14 日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	S-1＋DTX 療法(術後補助)

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル S-1	40mg/㎡ <1.25 ㎡：80mg <1.25～1.5 ㎡：100mg >1.5 ㎡：120mg		DIV PO	60 分 1 日 2 回 朝夕	d 1 d 1～d14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	6 コース		

がん種	レジメン名
胃がん	SOX 療法(胃がん)

抗がん剤名	標準投与量		最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
オキサリプラチン S-1	130mg/㎡ <1.25 ㎡：80mg <1.25～1.5 ㎡：100mg >1.5 ㎡：120mg			DIV PO	120 分 1 日 2 回 朝夕	d1 d1～d14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		8 コース		

がん種	レジメン名
胃がん	weekly パクリタキセル療法（胃がん）

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日（d1、d8 等）
パクリタキセル	80mg/㎡		DIV	60 分	d1, 8, 15
1 コースの日数 （次コースまでの期間）	28日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	XELOX療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
オキサリプラチン カペシタビン	130mg/㎡ 2000mg/㎡		DIV PO	120 分 1 日 2 回 朝夕	d1 d1 夕～d15 朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	8 コース		

がん種	レジメン名
胃がん	Zolbetuximab＋CAPOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1 等)
ゾルベツキシマブ	【初回】 800mg/㎡ 【維持】 600mg/㎡維持		DIV DIV	60 分後まで 100mg/㎡/hr 以降 60 分毎に 100mg/㎡/hr で 速度アップ 400mg/㎡/hr まで 60 分後まで 75mg/㎡/hr 以降 60 分毎に 100mg/㎡/hr で 速度アップ 300mg/㎡/hr まで	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
カペシタビン	2000mg/㎡		PO	1 日 2 回 朝夕	d1 夕～d15 朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	PD となるまで ※CAPOX は 8 コースまで、以降カペシタビン併用		

がん種	レジメン名
胃がん	Zolbetuximab＋mFOLFOX6 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(dl等)
ゾルベツキシマブ	【初回】 800mg/㎡		DIV	開始60分後まで 100mg/㎡/hr 以降60分毎に 100mg/㎡/hrで 速度アップ 400mg/㎡/hrまで	d1
	【維持】 400mg/㎡ （2w投与）		DIV	開始60分後まで 50mg/㎡/hr 以降60分毎に 100mg/㎡/hrで 速度アップ 200mg/㎡/hrまで	d1
	【維持】 600mg/㎡ （3w投与）		DIV	開始60分後まで 75mg/㎡/hr 以降60分毎に 100mg/㎡/hrで 速度アップ 300mg/㎡/hrまで	d1、21
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120分	d1(d14、21)
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120分	d1(d14, 21)
フルオロウラシル	400mg/㎡		DIV	全開	d1(d14, 21)
フルオロウラシル	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1(d14、21)
1コースの日数 （次コースまでの期間）	14日 ﾋﾞﾛｲ3週と組み合わせた場合：42日	総コース数	PDとなるまで ※mFOLFOX6は4コースまで、 以降l-LV＋5-Fu併用		

がん種	レジメン名
胃がん	3週毎アブラキサン療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/㎡		DIV	30分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PDとなるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	トラスツズマブ デルクステカン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg		DIV	90 分 2 回目～30 分に短縮可	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	PDとなるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	ニボルマブ＋FOLFOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
オプジーボ	240mg/body		DIV	30分	d1
レボホリナート	200mg/㎡		DIV	120 分	d1
オキサリプラチン	85mg/㎡		DIV	120 分	d1
フルオロウラシル	400mg/㎡		DIV	全開	d1
フルオロウラシル	2400mg/㎡		持続静注	46時間	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	ニボルマブ＋SOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	360mg/body		DIV	30 分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
S-1	<1.25 ㎡：80mg <1.25～1.5 ㎡：100mg >1.5 ㎡：120mg		PO	1 日 2 回 朝夕	d1～d14
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	PD になるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	ニボルマブ+XELOX 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	360mg/body		DIV	30 分	d1
オキサリプラチン	130mg/㎡		DIV	120 分	d1
カペシタビン	2000mg/㎡		PO	1 日 2 回 朝・夕	d1夕～d15朝
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD となるまで		

がん種	レジメン名
胃がん	ニボルマブ単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ニボルマブ	240mg 480mg		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	240mg :14 日 480mg :28日	総コース数		PD となるまで	