婦人科がん

化学療法レジメン集

子宮頸がん
子宮体がん
卵巣がん

国家公務員共済組合連合会　立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

がん種	レジメン名
子宮頸がん	3wTC＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	175mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90～30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
子宮頸がん	3wTC＋ペムブロリズマブ±Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	175mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90～30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	3wTC:6 コース ペムブロリズマブ:35 コース ベバシズマブ:PD まで		

がん種	レジメン名
子宮頸がん	放射線併用CDDP単剤療法(Weekly)

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
シスプラチン	40mg/㎡		DIV	180 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	7日	総コース数	6回 (放射線治療開始日から基本としてd1,8,15,22,29,36 で投与)		

がん種	レジメン名
子宮頸がん	weekly CDDP＋ペムブロリズマブ＋RT 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【1～2 コース】					
シスプラチン	40mg/㎡		DIV	120 分	d1,8,15
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
【3～5 コース】					
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
【6～20 コース】					
ペムブロリズマブ	400mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	1～5 コース:21 日 6～20 コース:42 日	総コース数	20 コース ※CDDP:計 6 回投与 ※ペムブロリズマブ:計 35 回投与		

がん種 卵巣がん・ 子宮体がん・子宮頸がん	レジメン名 CPT-11＋CDDP療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
イリノテカン シスプラチン	60mg/㎡ 60mg/㎡		DIV DIV	90分 120 分	d1、d8、d15 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
子宮頸がん	NGT＋CDDP療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ノギテカン シスプラチン	0.75mg/㎡ 50mg/㎡		DIV DIV	30 分 120 分	d1～3 d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
子宮頸がん	セミプリマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
セミプリマブ	350mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
子宮頚がん	チソツマブ ベドチン単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
チソツマブ ベドチン	2mg/kg	200mg/body	DIV	30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数		規定なし	

がん種　　卵巣がん・ 子宮体がん・子宮頸がん	レジメン名 パクリタキセル単剤（Triweekly） 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日（d1、d8 等）
パクリタキセル	210mg/㎡		DIV	180 分	d1
1 コースの日数 （次コースまでの期間）	21日	総コース数	6コース		

がん種	レジメン名
子宮頸がん	TP＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	175mg/㎡		DIV	180 分	d1
シスプラチン	50mg/㎡		DIV	120 分	d1
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90～30 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
子宮頸がん	TP療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	175mg/㎡		DIV	180 分	d1
シスプラチン	50mg/㎡		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	6コース		

がん種	レジメン名
子宮体がん	3wTC+デュルバルマブ+オラパリブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【化学療法期】					
パクリタキセル	175mg/m^2		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC 5～6		DIV	60 分	d1
デュルバルマブ	1120mg/body		DIV	60 分	d1
【維持療法期】					
デュルバルマブ	1500mg/body		DIV	60 分	d1
	(Bw≦30kg 20mg/kg)		DIV	60 分	d1
オラパリブ	300mg×2 回/day		PO		d1～連日
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	【化学療法期】21 日 【維持療法期】28 日	総コース数	【化学療法期】最大 6 コース 【維持療法期】規定なし		

がん種	レジメン名
子宮体がん	3wTC+ペムブロリズマブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
【化学療法期】					
パクリタキセル	175mg/m^2		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC5		DIV	60 分	d1
ペムブロリズマブ	200mg/body		DIV	30 分	d1
【維持療法期】					
ペムブロリズマブ	400mg/body		DIV	30 分	d1
1 コースの日数	【化学療法期】21 日	総コース数	【化学療法期】最大 6 コース		
(次コースまでの期間)	【維持療法期】42 日		【維持療法期】最大 14 コース		

がん種	レジメン名
子宮体がん	Tri-Weekly AP療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン	60mg/㎡		DIV	10分以内	d1
シスプラチン	50mg/㎡		DIV	180 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数			

がん種	レジメン名
卵巣・子宮体がん	Tri-Weekly TC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	175～180mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	6コース(術後)		

がん種 卵巣がん・ 子宮体がん・子宮頸がん	レジメン名 weekly CPT－11単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
イリノテカン	100mg/㎡		DIV	90分	d1、d8、d15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
子宮体がん	ペムブロリズマブ＋レンバチニブ併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ペムブロリズマブ	① 200mg/body		DIV	30 分	d1
	② 400mg/body		DIV	30 分	d1
レンバチニブ	20mg/body		PO		d1～連日
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	① 21 日 ② 42 日	総コース数		規定なし	

がん種	レジメン名
卵巣がん	Bev＋DOXIL併用療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン (リポソーム製剤) ベバシズマブ	40mg/㎡ 15mg/kg or 10mg/kg		DIV DIV	1mg/分 90～30 分	d1 d1 d1,15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	DOXIL は総投与量 500mg/㎡まで Bev は単独で継続		

がん種	レジメン名
卵巣がん	Bev＋GEM療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90～30 分	d1
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1、d8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
卵巣がん	Bev＋GEM＋CBDCA療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90～30 分	d1
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30分	d1、8
カルボプラチン	AUC4		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	6～10サイクルまで Bev は PD、PS の悪化まで単独で投与		

がん種	レジメン名
卵巣がん	Bev＋オラパリブ療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ オラパリブ	15mg/kg 300mg×2 回/day		DIV PO	90～30 分	d1 d1～連日
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
卵巣がん	CBDCA+PLD+Bev 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン (リポソーム製剤)	30mg/㎡		DIV	1mg/分	d1
カルボプラチン	ACU5		DIV	120 分	d1
ベバシズマブ	10mg/kg		DIV	90～30 分	d1,15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28 日	総コース数	6 コース		

がん種	レジメン名
卵巣がん	dd－Weekly TC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	80mg/㎡	80mg/㎡	DIV	60 分	d1、d8、d15
カルボプラチン	AUC6	1000mg/body	DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	6コース		

がん種	レジメン名
卵巣がん	DOXIL(PLD)＋CBDCA療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン (リポソーム製剤)	30mg/㎡		DIV	1mg/分	d1
カルボプラチン	AUC5		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
卵巣がん	DOXIL(PLD)＋GEM療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン (リポソーム製剤) ゲムシタビン	25mg/㎡ 1000mg/㎡		DIV DIV	1mg/分 30分	d1 d1、8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21～28日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
卵巣がん	DOXIL(PLD)単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン (リポソーム製剤)	50mg/㎡	50mg/㎡	DIV	1mg/分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
卵巣がん	GEM+Bev 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90～30 分	d1
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30 分	d1,8
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	増悪するまで		

がん種	レジメン名
卵巣がん	GEM＋CBDCA療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30分	d1、8
カルボプラチン	AUC4		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
卵巣がん	GEM 単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30分	d1、8、15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	28日	総コース数	PD、PS の悪化まで		

がん種	レジメン名
卵巣がん	NGT＋Bev 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	90～30 分	d1
ノギテカン	1.25mg/㎡		DIV	30 分	d1～5
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
卵巣がん	NGT療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ノギテカン	1.5mg/㎡		DIV	30 分	d1～5
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
卵巣がん	Tri-Weekly DC＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
カルボプラチン	AUC6		DIV	60 分	d1
《2クール目 day1より》					
ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	30～90 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	6 コース(術後) 7 コース目以降は Bev を継続		

がん種	レジメン名
卵巣がん・子宮体がん	Tri-Weekly DC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル	75mg/㎡		DIV	120 分	d1
カルボプラチン	AUC 5		DIV	60 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	6コース(術後)		

がん種	レジメン名
卵巣がん・子宮体がん	Tri-Weekly DOC療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル	70mg/㎡		DIV	120 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数			

がん種	レジメン名
子宮体がん・卵巣がん	Tri-Weekly DP療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドセタキセル	70mg/㎡		DIV	120 分	d1
シスプラチン	60mg/㎡		DIV	180 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数			

がん種	レジメン名
卵巣がん	Tri-Weekly TC＋Bev療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル	175～ 180mg/㎡		DIV	180 分	d1
カルボプラチン	AUC 6		DIV	60 分	d1
《2クール目 day1より》 ベバシズマブ	15mg/kg		DIV	30～90 分	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21日	総コース数	6コース(術後) 7 コース目以降は Bev を継続		

がん種 卵巣がん・子宮体がん ・子宮頸がん	レジメン名 weekly TC 療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
パクリタキセル カルボプラチン	60mg/m^2 AUC 2		DIV DIV	60 分 60 分	d1,8,15 d1,8,15
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	6 コース		

がん種	レジメン名
子宮平滑筋肉腫	DXR単独療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
ドキソルビシン	75mg/㎡		DIV	全開	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	21 日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
絨毛性腫瘍	MA療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
メトトレキサート アクチノマイシンD	0.4mg/kg 10μg/kg (0.01mg/kg)	20mg/body 500μg/body (0.5mg/body)	DIV 又は IM DIV	30分又は筋注 30分	d1～4 d1～4
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		

がん種	レジメン名
異所性妊娠	メソトレキセート療法(異所性妊娠)

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
メトトレキサート	50mg/㎡		DIV 又は IM	30分又は筋注	d1
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	2 コース目が 必要な場合7日	総コース数	hCG低下基準を満たすまで (基本1コースのみ)		

がん種	レジメン名
絨毛性腫瘍	MTX単剤療法

抗がん剤名	標準投与量	最大投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8 等)
メトトレキサート	0.4mg/kg	20mg/body	DIV 又は IM	30分又は筋注	d1～5
1 コースの日数 (次コースまでの期間)	14日	総コース数	規定なし		