# 血液がん

## 化学療法レジメン集

# 悪性リンパ腫

（外来治療実施想定レジメンのみ）

国家公務員共済組合連合会　立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| ホジキンリンパ腫 | A＋AVD療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ドキソルビシン | 25mg/$m^2$ | | DIV | 30 分 | d1、15 |
| ビンブラスチン | 6mg/$m^2$ | 10mg/body | DIV | 全開 | d1、15 |
| ダカルバジン | 375mg/$m^2$ | | DIV | 180 分 | d1、15 |
| ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ | 1.2mg/kg | | DIV | 30 分以上 | d1、15 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | | 総コース数 | 最大 6 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 末梢性 T 細胞リンパ腫 | A+CHP 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ | 1.8mg/kg | | DIV | 30 分以上 | d 1 |
| シクロホスファミド | 750 mg/m$^2$ | | DIV | 180 分 | d 1 |
| ドキソルビシン | 50 mg/m$^2$ | | DIV | 全開 | d 1 |
| プレドニン | 100mg/body | | po | | d 1-5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | 総コース数 | 8 コース | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| ホジキンリンパ腫 | ABVD療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ドキソルビシン | 25mg/㎡ | | DIV | 5～30 分 | d 1、15 |
| ブレオマイシン | 10mg/㎡ | 15mg/body | DIV | 60 分 | d 1、15 |
| ビンブラスチン | 6mg/㎡ | 10mg/body | IV | | d 1、15 |
| ダカルバジン | 375mg/㎡ | | DIV | 60 分以上 | d 1、15 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28日 | 総コース数 | | 4～6 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
| --- | --- |
| マクログロブリン血症<br>/リンパ形質細胞リンパ腫 | BDR 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/$m^2$ | | SC | | d1,4,8,11 |
| デキサメタゾン | 40mg/body | | PO | | d1,4,8,11 |
| リツキシマブ | 375mg/$m^2$ | | DIV | 50mg/時～ | d11 |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | CHOEP 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| シクロホスファミド | 750 mg/m$^2$ | | DIV | 180 分 | d 1 |
| ドキソルビシン | 50 mg/m$^2$ | | DIV | 全開 | d 1 |
| ビンクリスチン | 1.4 mg/m$^2$ | 2mg/body | DIV | 全開 | d 1 |
| エトポシド | 100 mg/m$^2$ | | DIV | 60 分 | d 1-3 |
| プレドニン | 100mg/body | | po | | d 1-5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | 総コース数 | 8 コース | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | CHOP療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| シクロホスファミドドキソル | 750mg/㎡ | | DIV | 180 分 | d1 |
| ビシン | 50mg/㎡ | | DIV | 全開 | d1 |
| ビンクリスチン | 1.4mg/㎡ | 2mg/body | DIV | 全開 | d1 |
| プレドニゾロン | 100mg/body | | PO | | d1-5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | 総コース数 | | 4～8 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 原発性マクログロブリン血症 | DRC療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV | 15 分 | d1 |
| リツキシマブ | 375mg/$m^2$ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| シクロホスファミド | 200mg/$m^2$ | | PO | | d1～d5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | | 総コース数 | PD になるまで | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | GEM 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 1000mg/㎡ | DIV | 30 分 | d1、8、15 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | PD、PS の悪化まで | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 濾胞性リンパ腫 | G－CHOP療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| オビヌツズマブ | 1000mg/body | | DIV | 50mg/時～ | d1 (1 ｺｰｽ目のみ d1,8,15) |
| シクロホスファミド | 750mg/$m^2$ | | DIV | 180 分 | d2 |
| ドキソルビシン | 50mg/$m^2$ | | DIV | 全開 | d2 |
| ビンクリスチン | 1.3mg/$m^2$ | | DIV | 全開 | d2 |
| プレドニゾロン | 100mg | 2.0mg/body | po | | d1～5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | | 総コース数 | オビヌツズマブ:8 コース<br>CHOP:6 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 濾胞性リンパ腫 | G－ベンダムスチン療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| オビヌツズマブ | 1000mg/body | | DIV | 50mg/時～ | d1<br>(1 コース目のみ d1,8,15) |
| ベンダムスチン | 90mg/$m^2$ | | DIV | 60 分 | d2～3 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | | 総コース数 | 6 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 非ホジキンリンパ腫 | ポラツズマブ ベドチン+BR 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 375mg/㎡ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ | 1.8mg/kg | | DIV | 30 分(初回 90 分) | d2(2 コース目～d1or2) |
| ベンダムスチン | 90mg/㎡ | | DIV | 10分 | d2,3<br>(2 コース目～d1,2or2,3) |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | | 総コース数 | 6 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 非ホジキンリンパ腫 | Pola+R-CHP 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 375mg/㎡ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ | 1.8mg/kg | | DIV | 30 分(初回 90 分) | d2(2Kr 目～d1) |
| シクロホスファミド | 750mg/㎡ | | DIV | 180 分 | d2(2Kr 目～d1) |
| ドキソルビシン | 50mg/㎡ | | DIV | 全開 | d2(2Kr 目～d1) |
| プレドニゾロン | 100mg | | PO | | d1～5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | | 総コース数 | 6 コース | |

| 癌種<br>濾胞性リンパ腫<br>又は 辺縁帯リンパ腫 | レジメン名<br>R2 療法 |
|---|---|

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 375 mg/m$^2$ | | DIV | 50mg/時～<br>開始 | 1 コース目<br>d1,8,15,22<br>2～5 コース目<br>d1 |
| レナリドミド | 20mg/body | | PO | | d1～21 |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 12 回 | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | R－CHOP療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 375mg/㎡ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| シクロホスファミド | 750mg/㎡ | | DIV | 180 分 | d2 |
| ドキソルビシン | 50mg/㎡ | | DIV | 全開 | d2 |
| ビンクリスチン | 1.4mg/㎡ | 2mg/body | DIV | 全開 | d2 |
| プレドニゾロン | 100mg | | PO | | d1～5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21日 | | 総コース数 | 3～8 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | R－THP－COP療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 375mg/㎡ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| シクロホスファミド | 750mg/㎡ | | DIV | 180 分 | d2 |
| ピラルビシン | 50mg/㎡ | | DIV | 全開 | d2 |
| ビンクリスチン | 1.4mg/㎡ | | DIV | 全開 | d2 |
| プレドニゾロン | 100mg | 2mg/body | PO | | d1～5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21日 | | 総コース数 | 3～8コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | R－ベンダムスチン療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 375mg/㎡ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| ベンダムスチン | 90mg/㎡ | | DIV | 10分 | d1、d2 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28日 | | 総コース数 | 6コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | THP－COP療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| シクロホスファミド | 750mg/㎡ | | DIV | 180 分 | d1 |
| ピラルビシン | 50mg/㎡ | | DIV | 全開 | d1 |
| ビンクリスチン | 1.4mg/㎡ | 2mg/body | DIV | 全開 | d1 |
| プレドニゾロン | 100mg/body | | PO | | d1～5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21日 | 総コース数 | | 4～8 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| マントル細胞リンパ腫 | VR－CAP療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1、d4、d8、d11 |
| リツキシマブ | 375mg/㎡ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| シクロホスファミド | 750mg/㎡ | | DIV | 180 分 | d2(d1) |
| ドキソルビシン | 50mg/㎡ | | DIV | 全開 | d2(d1) |
| プレドニゾロン | 100mg | | PO | | d2～d6 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | | 総コース数 | 6～8 コース | |

| 癌種 ホジキンリンパ腫<br>未分化大細胞リンパ腫 | レジメン名<br>ブレンツキシマブ ベドチン単独療法 |
|---|---|

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ | 1.8mg/kg | | DIV | 30 分以上 | d1 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | | 総コース数 | 最大 16 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 大細胞型 B 細胞リンパ腫<br>濾胞性リンパ腫 | エプコリタマブ療法(2 ステップ漸増) |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1コース目】 | | | | | |
| エプコリタマブ | 0.16mg/body | | SC | | d1 |
| エプコリタマブ | 0.8mg/body | | SC | | d8 |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | SC | | d15,22 |
| 【2～3 コース目】 | | | | | |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | SC | | d1,8,15,22 |
| 【4～9 コース目】 | | | | | |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | SC | | d1,15 |
| 【10 コース目～】 | | | | | |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | SC | | d1 |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 濾胞性リンパ腫 | エプコリタマブ療法(3 ステップ漸増) |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1コース目】 | | | | | |
| エプコリタマブ | 0.16mg/body | | SC | | d1 |
| エプコリタマブ | 0.8mg/body | | SC | | d8 |
| エプコリタマブ | 3mg/body | | SC | | d15 |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | | | d22 |
| 【2～3 コース目】 | | | SC | | |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | | | d1,8,15,22 |
| 【4～9 コース目】 | | | SC | | |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | | | d1,15 |
| 【10 コース目～】 | | | SC | | |
| エプコリタマブ | 48mg/body | | | | d1 |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ維持療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| オビヌツズマブ | 1000mg/body | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 2 ヶ月(56 日) | | 総コース数 | 最大 12 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| ホジキンリンパ腫 | ニボルマブ単独療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ニボルマブ | 240mg/body<br>480mg/body | | DIV | 30 分 | d1 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 240mg 14日<br>480mg 28日 | 総コース数 | | 規定なし | |

| 癌種 | レジメン名 |
| --- | --- |
| T 細胞急性リンパ性白血病/<br>T 細胞リンパ芽球性リンパ腫 | ネララビン単独療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ネララビン | 1500mg/$m^2$ | | DIV | 120 分 | d1,3,5 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | 総コース数 | PD まで | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 末梢性 T 細胞リンパ腫 | プララトレキサート療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| プララトレキサート | 30mg/$m^2$ | | DIV | 全開 | d1,8,15,22,29,36 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 49 日 | 総コース数 | PD まで | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | ベンダムスチン単独療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンダムスチン | 120mg/㎡ | | DIV | 10 分 | d1、d2 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21日 | | 総コース数 | 6～8コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
| --- | --- |
| ATLL<br>非ホジキンリンパ腫 | モガムリズマブ単独療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| モガムリズマブ | 1mg/kg | | DIV | 180 分 | d1 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 7 日 | 総コース数 | | 8 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | モスネツズマブ+ポラツズマブ ベドチン療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1コース目】 | | | | | |
| モスネツズマブ | 5mg/body | | SC | | d1 |
| モスネツズマブ | 45mg/body | | SC | | d8,15 |
| 【2～8 コース目】 | | | | | |
| モスネツズマブ | 45mg/body | | SC | | d1 |
| 【1～6 コース目】 | | | | | |
| ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ | 1.8mg/kg | | DIV | 30 分(初回 90 分) | d1 |
| 1 コースの日数 | 21 日 | 総コース数 | モスネツズマブ:8 コース<br>ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ:6 コース | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 濾胞性リンパ腫 | モスネツズマブ療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼点滴静注 | | | | | |
| 【1コース目】 | | | | | |
| モスネツズマブ | 1mg/body | | DIV | 240 分 | d1 |
| モスネツズマブ | 2mg/body | | DIV | 240 分 | d8 |
| モスネツズマブ | 60mg/body | | DIV | 240 分 | d15 |
| 【2 コース目】 | | | | | |
| モスネツズマブ | 60mg/body | | DIV | 120 分 | d1 |
| 【3～8 コース目】 | | | | | |
| モスネツズマブ | 30mg/body | | DIV | 120 分 | d1 |
| ▼皮下注 | | | | | |
| 【1コース目】 | | | | | |
| モスネツズマブ | 5mg/body | | SC | | d1 |
| モスネツズマブ | 45mg/body | | SC | | d8 |
| モスネツズマブ | 45mg/body | | SC | | d15 |
| 【2～8 コース目】 | | | | | |
| モスネツズマブ | 45mg/body | | SC | | d1 |
| 1 コースの日数 | 21 日 | 総コース数 | 完全奏効(CR):8 コース<br>部分奏効(PR)又は病勢安定(SD)の場合<br>:17 コース | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | リツキシマブ単独療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 375mg/㎡ | | DIV | 50mg/時～ | d1 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 7日<br>維持療法:8週 | | 総コース数 | 4～8コース<br>維持療法:12 コース | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 末梢性 T 細胞リンパ腫 | ロミデプシン療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロミデプシン | 14 mg/m$^2$ | | DIV | 240 分 | d1,8,15 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |