# 血液がん

化学療法レジメン集

# 多発性骨髄腫
# 全身性アミロイドーシス

国家公務員共済組合連合会　立川病院

薬剤科

2026/09/01 作成

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | CyBorD 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC or IV | | d1、4、8、11 |
| シクロホスファミド | 300mg/㎡ | 500mg/㎡ | DIVor | | d1、8 |
| デキサメタゾン | 40mg/day | | PO | | d1、2、4、5、8、9、11、12 |
| | | | PO | | |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21 日 | | 総コース数 | 4 コース(目安として) | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | DBd療法 |

【1～3 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | | D 1,8,15 |
| ボルテゾミブ | 1.3 mg | | SC | | D 1,4,8,11 |
| デキサメタゾン | 20 mg | | DIV/PO | | D 1,2,4,5,8,<br>9,11,12,(15)※<br>※医師判断で追加可能 |
| 1 コースの日数 | 21 日 | 総コース数 | 3 回 | | |

【4～8 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | | D 1 |
| ボルテゾミブ | 1.3 mg | | SC | | D 1,4,8,11 |
| デキサメタゾン | 20 mg | | DIV/PO | | D1,2,4,5,8,9,11,<br>12 |
| 1 コースの日数 | 21 日 | 総コース数 | 5 回 | | |

【9 コース目以降】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | | D1 |
| デキサメタゾン | 20mg | | DIV/PO | | D1 |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | DBLd 療法【自家移植適応】 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【導入療法期】 | | | | | |
| ダラツムマブ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | 【1～2コース目】d1,8,15,22 |
| /ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | | | | | 【3～4 コース目】d1,15 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/$m^2$ | | SC | | d1,4,8,11 |
| レナリドミド | 25mg/body | | PO | | d1～21 |
| デキサメタゾン | 40mg/body | | PO | | d1～4,9～12 |
| | | | | | |
| 【地固め療法期】 | | | | | |
| ダラツムマブ | | | | | |
| /ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1,15 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/$m^2$ | | SC | | d1,4,8,11 |
| レナリドミド | 25mg/body | | PO | | d1～21 |
| デキサメタゾン | 40mg/body | | PO | | d1～4,9～12 |
| | | | | | |
| 【維持療法期】 | | | | | |
| ダラツムマブ | | | | | |
| /ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1 |
| レナリドミド | 10mg/body | | PO | | d1～28 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 1 コース 28 日 | 総コース数 | 増悪するまで | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | DBLd 療法【自家移植非適応】 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダラツムマブ<br>/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | 【1～2 コース目】<br>d 1,8,15<br>【3 コース目～】<br>d 1 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/m$^2$ | | SC | | 【1～8 コース目】<br>d1,4,8,11 |
| レナリドミド | 25mg/body | | PO | | 【1～8 コース目】<br>d 1～14<br>【9 コース目～】<br>d 1～21 |
| デキサメタゾン | 20mg/body<br><br>40mg/body | | PO | | 【1～8 コース目】<br>d 1,2,4,5,8,9,11,12<br>【9 コース目～】<br>d 1,8,15,22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 【1～8 コース目】<br>1 コース:21 日<br>【9 コース目～】<br>1 コース:28 日 | 総コース数 | 増悪するまで | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | DCd療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1,8,15,22 |
| カルフィルゾミブ | 20mg/m$^2$ | | DIV | 30 分 | d1,2 |
| カルフィルゾミブ | 56mg/m$^2$ | | DIV | 30 分 | d8,9,15,16 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | PO | | d1,2,8,9,15,16 22,23 |
| 【2 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾ | 1800mg | | | 3～5 分 | d1,8,15,22 |
| カルフィルゾミブ | 56mg/m$^2$ | | SC | 30 分 | d1,2,8,9,15,16 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV | 30 分 | d1,2,8,9,15,16 |
| | | | DIV or PO | | 22,23 |
| 【3～6 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾ | 1800mg | | | 3～5 分 | d1,15 |
| カルフィルゾミブ | 56mg/m$^2$ | | SC | 30 分 | d1,2,8,9,15,16 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV | 30 分 | d1,2,8,9,15,16 |
| | | | DIV or PO | | 22,23 |
| 【7 コース目以降】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾ | 1800mg | | | 3～5 分 | d1 |
| カルフィルゾミブ | 56mg/m$^2$ | | SC | 30 分 | d1,2,8,9,15,16 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV | 30 分 | d1,2,8,9,15,16 |
| | | | DIV or PO | | 22,23 |
| 1 コースの日数 (次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 全身性 AL アミロイドーシス | DCyBorD 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1～2 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg/ | | SC | 3～5 分 | d1,8,15,22 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1,8,15,22 |
| シクロホスファミド | 300mg/㎡ | 500mg/body | PO | | d1,8,15,22 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | PO | | d1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 【3～6 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1,15 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1,8,15,22 |
| シクロホスファミド | 300mg/㎡ | 500mg/body | PO | | d1,8,15,22 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | PO | | d1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 【7 コース目以降】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | PO | | d1 |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 24 コース | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | DLd療法 |

【1～2 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | D 1,8,15,22 |
| レナリドミド | 25 mg | 25 mg | PO | | D 1-21 |
| デキサメタゾン | 20 mg | 20 mg | PO | | D1,2,8,9,15, 16,22,23 |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 2 回 | | |

【3～6 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | D 1,15 |
| レナリドミド | 25 mg | 25 mg | PO | | D 1-21 |
| デキサメタゾン | 20 mg/日 | 20 mg | PO | | D 1,2,15,16 |
| | 40 mg/週 | 40 mg | PO | | D8～14,22～28 の いずれか |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 4 回 | | |

【7 コース目以降】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | D 1 |
| レナリドミド | 25 mg | 25 mg | PO | | D 1-21 |
| デキサメタゾン | 20 mg/日 | 20 mg | PO | | D 1,2 |
| | 40 mg/週 | 40mg | PO | | D 8～14,15～21, 22～28 のいずれか |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | DMPB 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1,8,15,22,29,36 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/$m^2$ | | SC | | d1,4,8,11,22,25,29,32 |
| メルファラン | 9mg/$m^2$ | | PO | | d1～4 |
| プレドニゾロン | 60mg/$m^2$ | | PO | | d2～4 |
| 【2～9 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | DIV | | d1,22 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/$m^2$ | | SC | 3～5 分 | d1,8,22,29 |
| メルファラン | 9mg/$m^2$ | | PO | | d1～4 |
| プレドニゾロン | 60mg/$m^2$ | | PO | | d2～4 |
| 【10 コース目～】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 42 日(～9kr)<br>28 日(10kr～) | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | DPd 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1～2 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1,8,15,22 |
| ポマリドミド | 4mg/body | | PO | | d1-21 |
| デキサメタゾン | 20mg | | PO | | d1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 【3～6 コース目】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1,15 |
| ポマリドミド | 4mg/body | | PO | | d1-21 |
| デキサメタゾン | 20mg | | PO | | d1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 【7 コース目以降】 | | | | | |
| ダラツムマブ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ | 1800mg | | SC | 3～5 分 | d1 |
| ポマリドミド | 4mg/body | | PO | | d1-21 |
| デキサメタゾン | 20mg | | PO | | d1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 1 コースの日数 | 28 日 | 総コース数 | 増悪するまで | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | E-Ld 療法 |

【1～2 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| エロツズマブ | 10 mg/kg | | DIV | 30mL/hr～ | D 1,8,15,22 |
| レナリドミド | 25 mg | 25 mg | PO | | D 1～21 |
| デキサメタゾン | 28 mg | 28 mg | PO | | D 1,8,15,22 |
| デキサメタゾン | 6.6 mg | 6.6 mg | DIV | | D 1,8,15,22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 2 回 | | |

【3 コース目以降】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| エロツズマブ | 10 mg/kg | | DIV | 300mL/hr～ | D 1,15 |
| レナリドミド | 25 mg | 25mg | PO | | D 1～21 |
| デキサメタゾン | 28 mg | 28 mg | PO | | D 1,15 |
| デキサメタゾン | 40 mg | 40 mg | PO | | D 8,22 |
| デキサメタゾン | 6.6 mg | 6.6 mg | DIV | | D 1,15 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | Isa-d 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| イサツキシマブ | 20mg/kg | | DIV | 25mL/hr～<br>200mL/h | 【1 コース目】<br>d 1,8,15,22<br>【2 コース目～】<br>d 1,15 |
| デキサメタゾン | 40mg/body | | DIV/PO | | d 1,8,15,22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | Isa-Kd 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1 コース目】 | | | | | |
| イサツキシマブ | 10mg/kg | | DIV | 25mL/hr～ | d 1,8,15,22 |
| カルフィルゾミブ | 20 mg/m$^2$ | | DIV | 30 分 | d 1,2 |
| カルフィルゾミブ | 56 mg/m$^2$ | | DIV | 30 分 | d 8,9,15,16 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV/PO | 15 分 | d 1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 【2 コース目～】 | | | | | |
| イサツキシマブ | 10mg/kg | | DIV | 200mL/hr | d 1,15 |
| カルフィルゾミブ | 56 mg/m$^2$ | | DIV | 30 分 | d 1,2,8,9,15,16 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV/PO | 15 分 | d 1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | Isa-Pd 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| イサツキシマブ | 10mg/kg | | DIV | 25mL/hr～<br><br>200mL/hr | 【1 コース目】<br>d 1,8,15,22<br>【2 コース目～】<br>d 1,15 |
| ポマリドミド | 4mg/body | | PO | | d 1-21 |
| デキサメタゾン | 40mg/body | | DIV/PO | | d 1,8,15,22, |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | Isa-VRd 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【寛解導入期】 | | | | | 【1 コース目】 |
| イサツキシマブ | 10mg/kg | | DIV | 25mL/hr～ | d1,8,15,22,29 |
| | | | | | 【2～4 コース目】 |
| | | | | | d1,15,29 |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/$m^2$ | | SC | | d1,4,8,11,22,25, 29,32 |
| レナリドミド | 25mg/body | | PO | | d1-14,22-35 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV/PO | | d1,2,4,5,8,9,11,12, 15,22,23,25,26,29 ,30,32,33 |
| 【継続投与期】 | | | | | 【5～17 コース目】 |
| イサツキシマブ | 10mg/kg | | DIV | 200mL/hr | d1,15 |
| レナリドミド | 25mg/body | | PO | | d1～21 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV/PO | | d1,8,15,22 |
| | | | | | 【18 コース目～】 |
| イサツキシマブ | 10mg/kg | | DIV | | d1 |
| レナリドミド | 25mg/body | | PO | | d1-21 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | DIV/PO | | d1,8,15,22, |
| 1 コースの日数 (次コースまでの期間) | 【寛解導入期】 42 日 【継続投与期】 28 日 | 総コース数 | 【寛解導入期】4 コース 【継続投与期】増悪するまで | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | Kd 療法 |

【1 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| カルフィルゾミブ<br>カルフィルゾミブ<br>デキサメタゾン | 20 mg/m$^2$<br>56 mg/m$^2$<br>20 mg | | DIV<br>DIV<br>DIV/PO | 30 分間<br>30 分間 | D 1,2<br>D 8,9,15,16<br>D1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 1 回 | | |

【2 コース目以降】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| カルフィルゾミブ<br>デキサメタゾン | 56 mg/m$^2$<br>20 mg | | DIV<br>DIV/PO | 30 分間 | D1,2,8,9,15,16<br>D1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | KRd 療法 |

【1 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| カルフィルゾミブ | 20 mg/m$^2$ | | DIV | 10 分間 | D 1,2 |
| カルフィルゾミブ | 27 mg/m$^2$ | | DIV | 10 分間 | D 8,9,15,16 |
| レナリドミド | 25 mg | | PO | | D 1-21 |
| デキサメタゾン | 40 mg | | DIV/PO | | D 1,8,15,22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 1 回 | | |

【2 コース目以降】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| カルフィルゾミブ | 27 mg/m$^2$ | | DIV | 10 分間 | D1,2,8,9,15,16※1) |
| カルフィルゾミブ | 27 mg/m$^2$ | | DIV | 10 分間 | D1,2,15,16※2) |
| レナリドミド | 25 mg | | PO | | D 1-21 |
| デキサメタゾン | 40 mg | | DIV/PO | | D 1,8,15,22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 18 回 | | |

※1) 2～12 コース目、　※2) 13～18 コース目

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | VCD療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1、4、8、11 |
| シクロホスファミド | 300mg/㎡ | | PO | | d1、8、15、22 |
| デキサメタゾン | 20mg/day | | PO | | d1～4、9～12、17～20<br>または d1、d8、d15、d22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | | 総コース数 | 4 コース(目安として) | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | VRd 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1,4,8,11 |
| レナリドミド | 25mg/body | | PO | | d1～14 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | PO | | d1,2,4,5,8,9,11,12 |
| 1 コースの日数 | 21 日 | | 総コース数 | | 8 コース |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | VRD lite 療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1,8,15,22 |
| レナリドミド | 15mg/body | | PO | | d1～21 |
| デキサメタゾン | 20mg/body | | PO | | d1,2,8,9,15,16,22,23 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 35 日 | 総コース数 | | 9 コース(目安として) | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | Kd 療法(週 1 回投与) |

【1 コース目】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| カルフィルゾミブ | 20 mg/m$^2$ | | DIV | 30 分間 | D1 |
| カルフィルゾミブ | 70 mg/m$^2$ | | DIV | 30 分間 | D8,15 |
| デキサメタゾン | 40 mg | | DIV/PO | | D1,8,15,22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 1 回 | | |

【2 コース目以降】

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| カルフィルゾミブ | 70 mg/m$^2$ | | DIV | 30 分間 | D1,8,15 |
| デキサメタゾン | 40 mg | | DIV/PO | | D1,8,15,22 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 28 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | エルラナタマブ療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1コース目】 | | | | | |
| エルラナタマブ | 12mg/body | | SC | | d1 |
| エルラナタマブ | 32mg/body | | SC | | d4 |
| 【2 コース目～】 | | | | | |
| エルラナタマブ | 76mg/body | | SC | | d1 |
| 1 コースの日数 | 1～24kr:7 日<br>25kr～ :14 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | トアルクエタマブ療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| A 法【漸増期】 | | | | | |
| トアルクエタマブ | 0.01mg/kg | | SC | | d1 |
| トアルクエタマブ | 0.06mg/kg | | SC | | d4 |
| トアルクエタマブ | 0.4mg/kg | | SC | | d8 |
| A 法【維持投与期】 | 0.4mg/kg | | SC | | d1 |
| B 法【漸増期】 | | | | | |
| トアルクエタマブ | 0.01mg/kg | | SC | | d1 |
| トアルクエタマブ | 0.06mg/kg | | SC | | d4 |
| トアルクエタマブ | 0.4mg/kg | | SC | | d8 |
| トアルクエタマブ | 0.8mg/kg | | SC | | d11 |
| B 法【維持投与期】 | 0.8mg/kg | | SC | | d1 |
| 1 コースの日数 | A 法漸増期　14 日<br>A 法維持投与期 7 日<br>B 法漸増期　24 日<br>B 法維持投与期 14 日 | 総コース数 | 規定なし | | |

| 癌種 | レジメン名 |
|---|---|
| 多発性骨髄腫 | ボルテゾミブ＋DEX療法 |

| 抗がん剤名 | 標準投与量 | 最大投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日(d1、d8 等) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1、4、8、11 |
| デキサメサゾン | 20mg/body | | 内服 | | d1、2、4、5、<br>(8、9、11、12) |
| 【維持療法】 | | | | | |
| ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | | SC | | d1、8、15、22 |
| デキサメサゾン | 20mg/body | | 内服 | | d1～4 |
| 1 コースの日数<br>(次コースまでの期間) | 21日<br>維持療法:35日 | | 総コース数 | | |